Hauttumorzentrum Hannover (HTZH)

Melanom

Stadium II/III/IV Primärtumor

adjuvant (tumorfrei)

Stadium III/IV

Second-Line

C4221023 Portside (EncoBini + Pembrolizumab vs. Nivolumab + Ipilimumab bei BRAF-V600E/K)

Einschluss u.a.:
Metastasiertes oder nicht resezierbares lokal fortgeschrittenes Melanom mit BRAF-V600E/K-Mutation ,
Eine vorherige systemische Therapie des Melanoms erhalten haben (entweder adjuvante Therapie oder First-line Anti-PD-1-Monotherapie (Nivolumab oder Pembrolizumab)

Ausschluss u.a.:
Mukosales oder okuläres Melanom,
chronischen systemischen Steroid-Therapie oder einer anderen Form der immunsuppressive Therapie innerhalb der letzten 2 Jahre
Thromboembolische oder zerebrovaskuläre Ereignisse in der Anamnese ≤ 12 Wochen vor Randomisierung.

nicht melanozytärer Hautkrebs

Merkelzellkarzinom

MCC-TRIM (Beobachtungsstudie, MERCK)
Nichtinterventionelle Kohortenregister-Studie zur Bewertung der Merkmale und des Managements von Patienten mit Merkelzellkarzinom in Deutschland.

Plattenepithelkarzinom

CemiSkin (Beobachtungsstudie)
nicht- interventionelle Kohortenstudie für Patienten mit Plattenepithelkarzinom , die mit Libtayo ® / Cemiplimab behandelt werden

Nicht Interventionelle Studie (NIS) Beobachtungsstudien - Melanom

Bering
Encorafenib plus Binimetinib bei Patienten mit lokal fortgestrittenem nicht - resezierbarem oder metastasiertem, BRAF V600-mutiertem Melanom: eine multi-zentrische, multi-nationale, prospektive

Nicht Interventionelle Studie (NIS) Beobachtungsstudien - Lymhome

MINT
Mogamulizumab in einer nicht-interventionellen Studie zur Bewertung von Sicherheit und Therapieerfolg bei der Behandlung von Mykosis Fungoides und Sézary-Syndrom