

Melanom

Hauttumorzentrum Hannover (HTZH)

perioperativ

nicht melanozytärer  
Hautkrebs

Stadium III/IV

Nicht Interventionelle Studie (NIS)  
Beobachtungsstudien - Melanom

Second-Line

**ERAS-254-02**

**Einschluss:**

Histologisch oder zytologisch bestätigtes nicht resektables oder metastasiertes kutanes (einschließlich akrales) Melanom, NRAS-Mutation, Tumorgewebe nicht älter als 5 Jahre, Vorhandensein von mindestens 1 messbarer Läsion gemäß RECIST v1.1, Anti-PD-1/L1 basierende Therapie (Monotherapie oder Kombination) erhalten haben

**Ausschluss:**

Aderhaut- oder Schleimhautmelanom, Vorherige Therapie mit einem ERK-, MEK-, RAF- oder RAS-Inhibitor, kontrollierten ZNS-Metastasen sind erlaubt, Beeinträchtigung der Magen-Darm-Funktion oder Magen-Darm Erkrankung

Demnächst

**EuMelaReg / Decide II  
(MSD\_NIS102870\_DEC/DEII)**

Entscheidung für oder gegen den Einsatz von anti-PD1 Inhibitoren in der Adjutanten Behandlung von resezierten Melanom im Stadium IIB/IIC in Europa