

## Melanom

### Stadium II/III/IV Primärtumor

#### adjuvant (tumorfrei)

#### MK7684A-010 (KEYVIBE) (Vibostolimab + Pembrolizumab versus Pembrolizumab mono )

Einschluss u.a.:

komplett rezidiertes Stadium IIB, IIC, III, IV  
Melanom  
Sentinel Lymphknotenbiopsie / komplette  
Lymphknotenentfernung ist keine Voraussetzung  
ECOG 0/1  
Tumorgewebe (maximal 12 Wochen vor  
Randomisierung)

Ausschluss u.a.:

vorherige systemische, adjuvante Therapie  
Melanom des Auges oder der Schleimhäute  
Vorgeschichte von ZNS-Metastasen und/oder  
karzinomatöser Meningitis  
medikamentös therapierte, aktive  
Autoimmunerkrankung

### Stadium III/IV

#### First-Line

#### C4221016 Starboard (EncoBini+Pembrolizumab vs Pembrolizumab bei BRAF-Mutation)

Ein/Ausschluss u.a.:

Stad. IIIB/IIIC/D/IV  
Melanom  
Keine Mukosal- oder Aderhautmelanome  
Hirnmastasen erlaubt (stabil und vorbehandelt)  
BRAF V600E/K Mutation

Erlaubte Vortherapien:

nur adjuvante Vortherapien  
erlaubt, 6-monatige Auswaschphase

#### Second-Line

#### C4221023 Portside (EncoBini + Pembrolizumab vs. Nivolumab + Ipilimumab bei BRAF-V600E/K)

Einschluss u.a.:

Metastasiertes oder nicht resezierbares lokal  
fortgeschrittenes Melanom mit BRAF-V600E/K-  
Mutation ,  
Eine vorherige systemische Therapie des Melanoms  
erhalten haben (entweder  
adjuvante Therapie oder First-line Anti-PD-1-  
Monotherapie (Nivolumab oder  
Pembrolizumab)

Ausschluss u.a.:

Mukosales oder okuläres Melanom,  
chronischen systemischen Steroid-Therapie oder  
einer anderen Form der  
immunsuppressive Therapie innerhalb der letzten 2  
Jahre  
Thromboembolische oder zerebrovaskuläre  
Ereignisse in der Anamnese ≤ 12 Wochen vor  
Randomisierung.

## Hauttumorzentrum Hannover (HTZH)

### nicht melanozytärer Hautkrebs

#### Merkelzellkarzinom

**MCC-TRIM  
(Beobachtungsstudie, MERCK)**  
Nichtinterventionelle Kohortenregister-  
Studie zur Bewertung der Merkmale und des  
Managements von Patienten mit  
Merkelzellkarzinom in Deutschland.

#### Plattenepithelkarzinom

**CemiSkin  
(Beobachtungsstudie)**  
nicht- interventionelle Kohortenstudie  
für Patienten mit Plattenepithelkarzinom ,  
die mit Libtayo ® / Cemiplimab behandelt  
werden

### Nicht Interventionelle Studie (NIS) Beobachtungsstudien - Melanom

#### Bering

Encorafenib plus Binimetinib bei Patienten  
mit lokal fortgeschrittenem nicht -  
resezierbarem oder metastasiertem, BRAF  
V600-mutiertem Melanom: eine multi-  
zentrische, multi-nationale, prospektive

### Nicht Interventionelle Studie (NIS) Beobachtungsstudien - Lymhome

#### MINT

Mogamulizumab in einer nicht-  
interventionellen Studie zur Bewertung von  
Sicherheit und Therapieerfolg bei der  
Behandlung von Mykosis Fungoides und  
Sézary-Syndrom