

Melanom

Stadium III resektabel

neoadjuvant (vor OP)

L19IL2 + L19TNF + OP vs nur OP (PIVOTAL, Philogen)

Einschluss u.a.: St. IIIB/C, vollst. resezierbare bzw. injizierbare Läsionen (>10mm)

Ausschluss u.a.: Uvea-/Schleimhaut-MM, Infektionserkr., Herzerkr., Autoimmunerkr.

Stadium III / IV Primärtumor

adjuvant (tumorfrei)

CA 224-098 (RELATIVITY-098)

Einschluss u.a.: -Stadium IIIA (> 1 mm Tumor im Lymphknoten)/B/C/D oder Stadium IV(R0) - ECOG 0/1 , vollständige Resektion innerhalb von 12 Wochen vor der Randomisierung ,Für Biomarker-Analysen muss Tumorgewebe bereitgestellt werden

Ausschluss u.a.: -Aderhautmelanom ,unbehandelte/nicht resezierte ZNS, Metastasen oder leptomeningeale Metastasen -aktive, bekannte oder vermutete Autoimmunerkrankung , vorherige Immuntherapien sind nicht erlaubt

Stadium III/IV

Second-Line

BNT111-01 (BNT111+Cemiplimab oder Einzelwirkstoff)

Einschluss u.a.:
Histologisch bestätigtes nicht resezierbares kutanes Melanom Stadium III/IV (metastasiertes) messbare Erkrankung, bestätigte Krankheitsprogression während/nach zugelassenen Anti-PD-1-Therapie, zuvor mindestens 1 nicht mehr als 5 Therapielinie, LDH ≤ ULN, ECOG ≤ 1

Ausschluss u.a.:
Uveal-, Acral- oder Schleimhautmelanom, Vorgeschichte/aktuelle Hinweise auf signifikante Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Splenektomie , Aktuelle Anwendung/Anwendung innerhalb von 3 Monaten vor Studieneinschluss zur systemischen Immunsuppression

Nicht Interventionelle Studie (NIS) Beobachtungsstudien

Bering

Encorafenib plus Binimetinib bei Patienten mit lokal fortgestrittenem nicht - resezierbarem oder metastasiertem, BRAF V600-mutiertem Melanom: eine multi-zentrische, multi-nationale, prospektive

Combi-EU

Eine nicht-interventionelle Beobachtungsstudie zur Inhibierung von BRAF und MEK mit Dabrafenib und Trametinib als adjuvante Therapie bei Patienten mit Melanom

nicht melanozytärer Hautkrebs

Merkelzellkarzinom

**MCC-TRIM
(Beobachtungsstudie, MERCK)**
Nichtinterventionelle Kohortenregister-Studie zur Bewertung der Merkmale und des Managements von Patienten mit Merkelzellkarzinom in Deutschland.

Plattenepithelkarzinom

**CemiSkin
(Beobachtungsstudie)**
nicht- interventionelle Kohortenstudie für Patienten mit Plattenepithelkarzinom , die mit Libtayo ® / Cemiplimab behandelt werden